

**Инструкция: выберите один или несколько правильных ответов.**

**1. Научной основой сестринского дела является:**

- а) сестринский диагноз
- б) сестринское обследование
- в) сестринский процесс
- г) философия сестринского дела

**2. Ранний неонатальный период - это период от:**

- а) 0 до 7 дней жизни
- б) 0 до 14 дней жизни
- в) 7 до 28 дней жизни
- г) 5 до 28 дней жизни

**3. Профилактика тяжелой реакции на госпитализацию у ребёнка 1 года жизни:**

- а) раздельное пребывание матери и ребёнка
- б) отвлечение игрушкой
- в) госпитализация матери с ребёнком
- г) медицинская сестра чаще подходит к ребёнку

**4. В функциональные обязанности палатной медицинской сестры входит:**

- а) выполнение независимых вмешательств
- б) отмена болезненных процедур
- в) назначение лечебной диеты
- г) выполнение назначений врача

**5. Причиной полового криза у новорожденных детей является:**

- а) родовая травма
- б) поступление эстрогенов во время родов от матери к плоду
- в) гемолитическая болезнь новорожденных
- г) истинный узел пуповины

**6. Сестринский процесс при гнойном конъюнктивите в период новорожденности:**

- а) соблюдение санитарно – эпидемиологического режима в отделении
- б) туалет глаз раствором борной кислоты
- в) промывание глаз 0,05 % раствором перманганата калия
- г) промывание глаз раствором левомицетина

**7. Гестационный возраст доношенного ребёнка (в неделях):**

- а) 34-37
- б) 38-43
- в) 37-42
- г) 40-42

**8. Частота дыхания у здорового новорожденного ребёнка в 1 минуту:**

- а) 25-30
- б) 40-60
- в) 60-80
- г) 20-25

**9.К признакам недоношенности относится:**

- а) слабый крик
- б) большой родничок открыт
- в) масса тела менее 2500 г
- г) масса тела более 2500 г

**10.Оценка по шкале Апгар у здорового ребёнка составляет (в баллах):**

- а) 5-7
- б) 10-12
- в) 6-7
- г) 8-10

**11.К физиологическим состояниям новорожденного относятся:**

- а) цианоз
- б) потница
- в) мочекишный инфаркт
- г) половой криз

**12.Причиной родовой травмы может быть:**

- а) незапланированная беременность
- б) стремительные роды
- в) применение щипцов во время родов
- г) нарушение асептики

**13.Кожные покровы при сепсисе у новорожденного:**

- а) розовые
- б) цианотичные
- в) бледно-серые
- г) гиперемированы

**14.Стафилококковая инфекция является причиной:**

- а) эритемы
- б) везикулопустулеза
- в) омфалита
- г) опрелостей

**15.Симптомы кандидозного стоматита:**

- а) герпетические высыпания на слизистой полости рта
- б) множественные язвы на слизистой полости рта
- в) гиперемия и сухость слизистой
- г) белый творожистый налет

**16.Причиной развития рахита является дефицит:**

- а) витамина Д
- б) селена, цинка
- в) кальция, фосфора
- г) железа, магния

**17. Основные симптомы атопического дерматита:**

- а) неукротимая рвота
- б) себорея, упорные опрелости при хорошем уходе
- в) запоры, метеоризм
- г) диарея, эксикоз

**18. При гемолитической болезни новорожденных желтуха появляется на:**

- а) 1 день жизни
- б) 3 день жизни
- в) 5 день жизни
- г) 7 день жизни

**19. Причина развития гипотрофии в раннем возрасте:**

- а) синдром мальабсорбции
- б) нарушение обмена кальция
- в) недостаток йода
- г) однообразное вскармливание

**20. Сестринский процесс при гипотрофии предполагает:**

- а) проведение коррекции питания
- б) строгий постельный режим
- в) поддержание эмоционального тонуса, прогулки
- г) ежедневное взвешивание

**21. Естественное вскармливание - это вскармливание:**

- а) адаптированными смесями и введение прикорма
- б) грудным молоком и введение прикорма
- в) грудным молоком и адаптированными молочными смесями
- г) грудным молоком и кефиром

**22. Обязанности медицинской сестры при искусственном вскармливании грудного ребёнка:**

- а) проводить коррекцию питания
- б) проверять правильность подогрева смесей
- в) заменять молочные смеси на аналогичные
- г) держать при кормлении ребёнка на руках

**23. Начальные проявления рахита:**

- а) потливость
- б) искривление ног
- в) чуткий сон
- г) мышечная гипотония

**24. Причинами возникновения сепсиса могут быть заболевания:**

- а) омфалит
- б) анемия
- в) пиодермия
- г) рахит

**25.Сестринский процесс при опрелостях, потнице:**

- а) воздушные ванны
- б) температура в палате 24-26°C
- в) соблюдение правил асептики
- г) обработка кожи хлорофиллиптом

**26.Причины развития железодефицитной анемии у детей:**

- а) вскармливание парным коровьим молоком
- б) обилие каш в рационе
- в) недостаток УФО
- г) длительное пребывание на свежем воздухе

**27.Факторы риска возникновения аллергозов:**

- а) аномалия конституции
- б) резус-конфликт
- в) недостаток витаминов
- г) воздействие табачного дыма

**28.Наиболее частые осложнения ринита у грудных детей:**

- а) ангина
- б) отит
- в) гайморит
- г) пневмония

**29.Предвестники приступа бронхиальной астмы:**

- а) зуд кожи
- б) чихание, першение в горле
- в) тошнота, рвота
- г) иктеричность кожи

**30.Сестринский процесс при бронхиальной астме включает в себя:**

- а) контроль за назначениями врача
- б) частое проветривание
- в) выбор медикаментозного лечения
- г) увеличение физической нагрузки

**31.Признаки дыхательных расстройств при пневмонии:**

- а) влажный кашель
- б) цианоз носогубного треугольника
- в) озноб
- г) одышка

**32.Сестринский процесс при пневмонии:**

- а) возвышенное положение в постели
- б) полный покой
- в) частая смена положения в постели
- г) температура в палате 24-26°C

**33. Ребёнку с ОРВИ для уменьшения симптомов интоксикации применяют:**

- а) оксигенотерапию
- б) обильное теплое питье
- в) калорийную диету
- г) горчичники

**34. Подсчет дыхательных движений у грудного ребёнка оптимально проводить:**

- а) после сна
- б) после кормления
- в) при пеленании
- г) во время сна

**35. Подмывание детей раннего возраста осуществляют:**

- а) кипяченой водой
- б) раствором фурацилина
- в) проточной водой
- г) 0,05% раствором перманганата калия

**36. Сестринские рекомендации при сухом кашле на фоне ОРВИ:**

- а) постуральный дренаж
- б) прием мукалтина
- в) теплое щелочное питье
- г) паровые ингаляции

**37. Симптомы вирусного крупа:**

- а) влажный кашель
- б) сухой, «лающий» кашель
- в) инспираторная одышка
- г) дыхание Кусмауля

**38. Противовирусные препараты:**

- а) амоксилав
- б) ацикловир
- в) аугментин
- г) арбидол

**39. Анализ мочи на диастазу берут для выявления патологии со стороны:**

- а) печени
- б) желудка
- в) почек
- г) поджелудочной железы

**40. Причины возникновения врожденных пороков сердца:**

- а) быстрые роды
- б) наследственная предрасположенность
- в) асфиксия в родах
- г) вирусные заболевания во время беременности

**41. Особенности ухода при врожденном пороке сердца:**

- а) отвлечь от переживаний, контроль за диетой № 10
- б) положение в кровати без подушки
- в) контролировать прием жидкости и массу тела
- г) поддерживать температуру в палате 26-28°C

**42. Инфекционный миокардит чаще может быть осложнением после:**

- а) скарлатины
- б) коклюша
- в) ангины
- г) паротита

**43. При врожденных пороках сердца нарушается деятельность:**

- а) дыхательной системы
- б) эндокринной системы
- в) нервной системы
- г) сердечно-сосудистой системы

**44. Симптомы одышечно-цианотических приступов:**

- а) бледность кожи
- б) усиление цианоза кожи и слизистых
- в) гиперемия кожи
- г) вынужденное положение больного

**45. Зуд в перианальной области у ребёнка характерен при:**

- а) аскаридозе
- б) энтеробиозе
- в) трихоцефаллезе
- г) описторхозе

**46. Клинические симптомы при пиелонефрите:**

- а) гипертензия
- б) дизурия
- в) анурия
- г) лихорадка

**47. Изменения в моче при гломерулонефрите:**

- а) глюкозурия
- б) гематурия
- в) бактериурия
- г) протеинурия

**48. Сестринский уход при гломерулонефрите в острый период:**

- а) контроль за диурезом
- б) режим палатный
- в) контроля за температурой тела, артериального давления (АД)
- г) введение мясных и рыбных бульонов

**49.Инсулин рекомендуется хранить:**

- а) в морозильном отделении холодильника
- б) при комнатной температуре
- в) в холодильнике при температуре +4°+6°С
- г) не имеет значения, где хранить

**50.Сестринские рекомендации при железодефицитной анемии:**

- а) полноценное питание, прогулки
- б) контроль за диурезом
- в) контроль за анализом крови
- г) контроль за артериальным давлением (АД)

**51.Злокачественное заболевание крови - это:**

- а) гемофилия
- б) тромбоцитопения
- в) лейкоз
- г) капилляротоксикоз

**52.Детей с лейкозом необходимо оберегать от:**

- а) общения с детьми
- б) инфекционных заболеваний
- в) эмоциональных игр
- г) прогулок

**53.Возбудитель кандидозного стоматита:**

- а) вирусы
- б) клостридии
- в) стафилококки
- г) грибки

**54.Клинические симптомы герпетического стоматита:**

- а) слюнотечение, отказ от пищи
- б) брадикардия
- в) диарея
- г) лихорадка

**55.Количество водного раствора лекарственного вещества в одной чайной ложке (в мл):**

- а) 1
- б) 5
- в) 10
- г) 8

**56.Клиническими симптомами энтеробиоза являются:**

- а) лихорадка, боли в животе
- б) зуд в области ануса
- в) мигрень
- г) беспокойный сон

**57. При вегетососудистой дистонии медсестра может порекомендовать:**

- а) соблюдение режима дня
- б) активный отдых на свежем воздухе
- в) освобождение от физкультуры
- г) иглорефлексотерапию

**58. К причинам возникновения гастродуоденита относится:**

- а) психоэмоциональные нагрузки
- б) гиподинамия
- в) заражение геликобактер - пилори
- г) вакцинопрофилактика

**59. Характер болей при гастродуодените с гиперсекрецией:**

- а) дневные
- б) постоянные
- в) голодные
- г) ночные

**60. Подготовка к эндоскопическому исследованию при подозрении на хронический гастрит предусматривает:**

- а) провести беседы с пациентом и родителями
- б) ввести контрастное вещество
- в) не кормить утром накануне исследования
- г) измерить суточный диурез

**61. Применение грелки предусматривает:**

- а) температуру воды в грелке 60-65°C
- б) температуру воды в грелке 70-80°C
- в) смену воды в грелке каждые 10 минут
- г) смену воды в грелке по мере ее остывания

**62. При дискинезии желчевыводящих путей из диеты исключают:**

- а) творог
- б) рыбные консервы
- в) бананы
- г) жареное мясо, грибы

**63. Уход при остром панкреатите предусматривает:**

- а) дробное кормление
- б) исключение энтерального питания
- в) грелку на живот
- г) помощь при рвоте

**64. Симптомы сахарного диабета у детей:**

- а) боли в животе опоясывающего характера
- б) сухость кожи, отеки
- в) жажда, полиурия, сухость кожи
- г) снижение общего иммунитета

**65.Сестринский процесс при сахарном диабете:**

- а) соблюдать диету № 9
- б) научить вводить инсулин
- в) измерять температуру тела
- г) измерять диурез

**66.Причины развития гипогликемии:**

- а) переедание
- б) передозировка инсулина
- в) физическое переутомление
- г) недостаточная доза инсулина

**67.Набор продуктов, рекомендуемых при диете № 9:**

- а) хлеб с отрубями, овощи, отварное мясо
- б) крепкие мясные и рыбные бульоны, фрукты
- в) кондитерские изделия, виноград, инжир
- г) гречневая, овсяная каши

**68.Источником заражения туберкулезом могут быть:**

- а) человек
- б) рогатый скот
- в) рыбы
- г) насекомые

**69.Проба Манту проводится:**

- а) 1 раз в год, начиная с 1-го года жизни
- б) 0,1мл туберкулина внутрикожно
- в) каждые 7 лет
- г) 0,1мл туберкулина подкожно

**70.Иммунопрофилактика туберкулеза новорожденным детям проводится:**

- а) на 3-7 день жизни
- б) на 10-14день
- в) внутрикожно
- г) подкожно

**71.Пути передачи инфекции при гепатите А:**

- а) контактно-бытовой
- б) трансмиссивный
- в) водно-пищевой
- г) парентеральный

**72.Карантинные мероприятия в очаге вирусного гепатита:**

- а) дезинфекция не проводится
- б) карантин 35 дней
- в) обследование контактных
- г) соблюдение диеты № 5

**73. Особенности течения эшерихиоза у детей раннего возраста:**

- а) стул с примесью крови, скудный
- б) рвота, эксикоз
- в) стул водянистый, обильный
- г) стул в виде «рисового отвара»

**74. Симптомы шигеллеза:**

- а) стул с прожилками крови, тенезмы
- б) стул обильный, водянистый
- в) стул в виде «болотной тины»
- г) лихорадка, боли в животе

**75. Сестринский процесс при кишечных инфекциях:**

- а) полоскание зева
- б) контроль за оральной дегидратацией
- в) текущая дезинфекция
- г) коррекции антибиотикотерапии

**76. Ротавирусная инфекция особенно тяжело протекает у:**

- а) взрослых
- б) новорожденных
- в) дошкольников
- г) подростков

**77. Возбудитель ветряной оспы:**

- а) вирус
- б) шигелла
- в) палочка Борде-Жангу
- г) менингококк

**78. Основной элемент при ветряной оспе:**

- а) папула
- б) пустула
- в) везикула
- г) макула

**79. Преджелтушный период при вирусном гепатите:**

- а) инкубационный
- б) продромальный
- в) разгар
- г) выздоровление

**80. Основные симптомы краснухи:**

- а) мелкопятнистая сыпь
- б) ангина
- в) увеличение лимфоузлов
- г) отеки

**81.Профилактика краснухи:**

- а) анализ крови на антитела
- б) вакцинация по возрасту
- в) мазок из зева на бакпосев
- г) карантин 21 день для контактных

**82.Путь передачи инфекции при эпидемическом паротите:**

- а) контактно-бытовой
- б) парэнтеральный
- в) воздушно-капельный
- г) водно-пищевой

**83.Варианты течения эпидемического паротита:**

- а) орхит
- б) панкреатит
- в) артрит
- г) лимфаденит

**84.Сестринский процесс при эпидемическом паротите:**

- а) сухое тепло на околоушную область
- б) изоляция на 10 дней, постельный режим
- в) масляный компресс на околоушную область
- г) введение сыворотки

**85.Симптомы продромального периода при кори:**

- а) кашель, насморк, конъюнктивит
- б) геморрагическая сыпь
- в) пятна Филатова-Бельского
- г) ангина

**86.Характер сыпи при кори:**

- а) геморрагическая, звездчатая
- б) пятнисто-папулезная
- в) высыпает поэтапно, сверху вниз
- г) высыпает одномоментно

**87.Сестринский уход при кори:**

- а) витаминизированное питание, теплое питье
- б) ограничение жидкости
- в) туалет кожи и слизистых
- г) ежедневный контроль за массой тела

**88.Основные симптомы скарлатины:**

- а) ангина
- б) диарея
- в) гипертензия
- г) мелкоточечная сыпь

**89. Осложнения при скарлатине:**

- а) миокардит
- б) панкреатит
- в) гломерулонефрит
- г) орхит

**90. Генерализованные формы менингококковой инфекции:**

- а) менингит
- б) миастения
- в) эзофагит
- г) сепсис

**91. Основные симптомы коклюша:**

- а) боль при жевании
- б) спазматический кашель
- в) склерит
- г) лимфаденит

**92. При метеоризме ребёнку грудного возраста применяют:**

- а) лекарственную клизму
- б) газоотводную трубку
- в) массаж живота по ходу толстого кишечника
- г) холод на область живота

**93. Вакцина для профилактики коклюша:**

- а) АДС
- б) ОПВ
- в) АКДС
- г) БЦЖ

**94. Основные симптомы дифтерии зева:**

- а) налеты в зеве серо-белого цвета
- б) интоксикация
- в) увеличение затылочных лимфоузлов
- г) спазматический кашель

**95. Противоэпидемические мероприятия при возникновении дифтерийной инфекции в детском соматическом отделении:**

- а) бактериологическое обследование контактных
- б) карантин 10 дней
- в) введение противодифтерийной сыворотки
- г) карантин 35 дней

**96. После перенесенного инфекционного заболевания у ребёнка вырабатывается иммунитет:**

- а) естественный
- б) искусственный
- в) активный
- г) пассивный

**97. При проведении пробы по Зимницкому необходимо собрать мочу:**

- а) суточную в одну посуду
- б) 8 порций через каждые 3 часа
- в) за 3 часа в любое время суток
- г) утреннюю

**98. Причины образования инфильтратов при внутримышечных инфекциях:**

- а) применение длинной иглы
- б) применение короткой иглы
- в) обработка инъекционного поля 1 ватным тампоном с 96% спиртом
- г) обработка инъекционного поля 2-мя ватными тампонами с 70% спиртом

**99. Признаки клинической смерти:**

- а) отсутствие диуреза
- б) отсутствие сознания
- в) отсутствие пульса и дыхания
- г) симптом «кошачьего глаза»

**100. Условия для проведения термометрии:**

- а) в покое, через 30 минут после сна
- б) длительность термометрии 5 минут
- в) длительность термометрии 10 минут
- г) сразу после еды

**101. Адаптационный период у новорожденного ребёнка длится от:**

- а) 7 до 28 дней жизни
- б) 0 до 7 дней жизни
- в) 0 до 28 дней жизни
- г) 0 до 21 дня жизни

**102. Основные жизненные потребности недоношенного ребёнка:**

- а) обильное питье
- б) естественное вскармливание
- в) согревание
- г) тугое пеленание

**103. Причины физиологической желтухи у новорожденных:**

- а) незрелость печени
- б) резус-конфликт
- в) распад эритроцитов
- г) родовая травма

**104. Причины гемолитической болезни новорожденных:**

- а) дефект плаценты
- б) резус-конфликт
- в) гестоз
- г) групповая несовместимость крови

**105.Причины возникновения сепсиса у новорожденных:**

- а) пиодермия
- б) кефалогематома
- в) родовая опухоль
- г) омфалит

**106.Сестринский процесс при сепсисе:**

- а) соблюдение правил асептики
- б) применение иммуномодуляторов
- в) контроль за массой тела, измерение температуры тела
- г) коррекция питания

**107.Цвет кожных покровов при асфиксии:**

- а) розовый
- б) иктеричный
- в) цианотичный
- г) бледный

**108.При асфиксии у новорожденных пульс в 1 минуту:**

- а) 120 ударов
- б) 80 ударов
- в) 140 ударов
- г) менее 60 ударов

**109.Кандидозный стоматит возникает при инфицировании:**

- а) вирусами
- б) грибами
- в) бактериями
- г) простейшими

**110.Симптомы гипотрофии у детей раннего возраста:**

- а) дефицит массы тела
- б) инспираторная одышка
- в) гидроцефалия
- г) диспептические явления

**111.Симптомы рахита в период разгара:**

- а) мышечный гипертонус
- б) мышечная гипотония
- в) деформация костей
- г) сухость кожи

**112.Атопический дерматит чаще развивается при:**

- а) естественном вскармливании
- б) искусственном вскармливании
- в) отягощенной наследственности
- г) длительном пребывании на свежем воздухе

**113.Контрольное кормление проводится при:**

- а) гипогалактии
- б) гипотрофии
- в) рахите
- г) анемии

**114.Докорм вводится при вскармливании:**

- а) естественном
- б) искусственном
- в) смешанном
- г) любом

**115.Мясное пюре вводится детям с возраста (в месяцах):**

- а) 6
- б) 7
- в) 8
- г) 10

**116.Возникновение потницы у детей связано с:**

- а) инфицированием кожи
- б) дефектами ухода
- в) применением памперсов
- г) охлаждением

**117.Симптомы железодефицитной анемии:**

- а) бледность кожи и слизистых
- б) снижение гемоглобина менее 110г/л
- в) цианоз кожных покровов
- г) снижение тромбоцитов в крови

**118.Болезни, сопровождающиеся кровоточивостью:**

- а) гемофилия
- б) гипотрофия
- в) капилляротоксикоз
- г) краснуха

**119.Сестринский процесс при анемии:**

- а) контроль за анализами мочи
- б) проветривание помещения, температура 20-22°C, ежедневные прогулки
- в) полноценное витаминизированное питание
- г) рекомендовать вегетарианство, молоко

**120.Наиболее часто возникающие осложнения при ОРВИ:**

- а) синуситы
- б) гломерулонефрит
- в) гастродуоденит
- г) пневмония

**121.Сестринский процесс при аллергическом рините:**

- а) гипоаллергенная диета
- б) применение антигистаминных препаратов
- в) посещение плавательного бассейна
- г) контроль за состоянием окружающей среды

**122.К антигистаминным препаратам относятся:**

- а) клемастин
- б) кларитин
- в) клотримазол
- г) каптоприл

**123.Симптомы приступного периода бронхиальной астмы:**

- а) инспираторная одышка
- б) экспираторная одышка
- в) свистящее дыхание
- г) «лающий» кашель

**124.Симптомы пневмонии у новорожденных детей:**

- а) ригидность мышц затылка
- б) одышка, апноэ
- в) раздувание крыльев носа
- г) гипертермия

**125.Обструктивный бронхит чаще развивается:**

- а) у детей до 4-х лет
- б) у подростков
- в) на фоне аскаридоза
- г) на фоне острой респираторной инфекции

**126.Особенности внутрибольничной пневмонии:**

- а) возбудители пневмонии устойчивы к антибиотикам
- б) течение болезни более легкое
- в) течение болезни более тяжелое
- г) осложнения редки

**127.Сестринский процесс при ОРВИ:**

- а) постельный режим, смена белья, теплое питье
- б) измерение диуреза, артериального давления (АД)
- в) прием противовирусных препаратов
- г) помощь при гипертермии

**128.Симптомы аденовирусной инфекции:**

- а) ринит, конъюнктивит
- б) спазматический приступообразный кашель
- в) лихорадка
- г) диарея, олигурия

**129.Одышно-цианотические приступы характерны при:**

- а) врожденных пороках сердца синего типа
- б) врожденных пороках сердца бледного типа
- в) аномалиях развития верхнего неба
- г) железодефицитной анемии

**130.Причины возникновения врожденных пороков сердца:**

- а) затяжные роды
- б) стремительные роды
- в) внутриутробные инфекции
- г) гемолитическая болезнь новорожденных

**131.Сестринский уход при остром миокардите:**

- а) постельный режим, температура в палате 20-22°, частое проветривание
- б) палатный режим
- в) контроль за пульсом, дыханием, температурой тела, суточным диурезом
- г) диета № 7

**132.Поражение нервной системы при ревматизме:**

- а) гидроцефалия
- б) хорей
- в) арахноидит
- г) менингит

**133.Возбудителем энтеробиоза являются:**

- а) лямблии
- б) острицы
- в) аскариды
- г) власоглав

**134.Основные симптомы энтеробиоза:**

- а) вульвовагинит у девочек
- б) боли в животе, беспокойный сон
- в) судороги, невротические реакции
- г) кашель, повышение температуры тела

**135.Профилактика гельминтозов включает в себя все, кроме:**

- а) регулярное обследование детей на гельминты
- б) соблюдение правил личной гигиены
- в) контроль за экологической обстановкой
- г) контроль за анализами мочи

**136.Для выявления энтеробиоза исследуют:**

- а) мочу
- б) кал
- в) перианальный соскоб
- г) кровь

**137. Факторы риска возникновения пиелонефрита у детей:**

- а) несоблюдение правил гигиены, охлаждение
- б) нерациональное питание
- в) аномалии развития мочевыводящих путей
- г) вакцинация согласно календарю прививок

**138. Симптомы, характерные для пиелонефрита:**

- а) дизурия
- б) лейкоцитурия
- в) глюкозурия
- г) уробилинурия

**139. Подготовка к проведению внутривенной урографии:**

- а) очистительная клизма вечером и утром за 2 часа до исследования
- б) прием мочегонных средств
- в) в течение 2-3 дней исключить из рациона продукты, вызывающие метеоризм
- г) приготовить емкость для сбора мочи

**140. Независимые сестринские вмешательства при гломерулонефрите:**

- а) обильное витаминизированное питье
- б) контроль за соблюдением диеты № 7
- в) контроль за суточным диурезом и массой тела
- г) коррекция медикаментозного лечения

**141. Сестринские рекомендации родителям ребёнка, перенесшего гломерулонефрит:**

- а) заниматься спортом
- б) обучить приемам психологической поддержки
- в) рекомендовать фитотерапию
- г) наблюдаться у нефролога по Ф-30

**142. Сестринский процесс при пиелонефрите включает все, кроме:**

- а) соблюдения повышенного питьевого режима
- б) соблюдения режима «принудительного» мочеиспускания
- в) строго соблюдения гигиены тела
- г) соблюдения диеты № 9

**143. К обменным нефропатиям относятся:**

- а) глюкозурия
- б) оксалатурия
- в) уратурия
- г) кетонурия

**144. Функциональное состояние почек оценивается по анализу мочи методом:**

- а) Нечипоренко
- б) Зимницкому
- в) Амбурже
- г) общего анализа

**145.Причины развития кандидозного стоматита:**

- а) несоблюдение правил личной гигиены
- б) кормление из бутылочки
- в) прием антибиотиков
- г) смешанное вскармливание

**146.Сестринский процесс при афтозном стоматите:**

- а) применение противовирусных препаратов по назначению врача
- б) обучение адекватному питанию, правилам личной гигиены
- в) проведение промывания желудка
- г) взятие кала для исследования на яйца глистов

**147.Особенности сахарного диабета у детей:**

- а) инсулинозависимый
- б) инсулинонезависимый
- в) быстрое развитие осложнений
- г) легкие формы болезни

**148.Сестринские рекомендации ребёнку с сахарным диабетом:**

- а) соблюдать диету
- б) научить вводить инсулин
- в) заниматься спортом
- г) охлаждать инсулин перед введением

**149.Осложнением язвенной болезни желудка могут быть:**

- а) желудочное кровотечение
- б) кишечное кровотечение
- в) рак желудка
- г) сахарный диабет

**150.Возбудитель туберкулеза:**

- а) клебсиелла
- б) клостридия
- в) микобактерия Коха
- г) микоплазма

**151.Специфическая профилактика туберкулеза проводится:**

- а) туберкулином
- б) антитоксической сывороткой
- в) вакциной БЦЖ
- г) вакциной ОПВ

**152.Проба Манту проводится:**

- а) для лечения туберкулеза
- б) туберкулином
- в) для диагностики
- г) вакциной БЦЖ-м

**153. Жидкий стул с примесью слизи и крови характерен для:**

- а) шигеллеза
- б) эшерихиоза
- в) холеры
- г) сальмонеллеза

**154. Наиболее частые осложнения при острых кишечных инфекциях:**

- а) менингит
- б) экзикоз
- в) дисбактериоз
- г) сепсис

**155. Сестринский процесс при кишечной инфекции:**

- а) проведение текущей дезинфекции
- б) постановка очистительной клизмы
- в) контроль за регидратацией
- г) забор кала на яйца глистов

**156. Карантинные мероприятия при кишечных инфекциях:**

- а) карантин на 21 день
- б) карантин на 7 дней
- в) бактериологический анализ кала
- г) вакцинопрофилактика

**157. При вирусном гепатите желтушный период - это период:**

- а) инкубационный
- б) продромальный
- в) разгара
- г) выздоровления

**158. Основные симптомы вирусного гепатита:**

- а) иктеричность кожи и слизистых
- б) нейротоксикоз с экзикозом
- в) обесцвеченный кал, темная моча
- г) олигурия, бактериурия

**159. Профилактика вирусного гепатита В:**

- а) карантин 180 дней
- б) вакцинация
- в) контроль за стерилизацией медицинских инструментов
- г) бактериологическое исследование кала

**160. Механизм передачи ротавирусной инфекции:**

- а) трансмиссивный
- б) парэнтеральный
- в) трансплацентарный
- г) фекально-оральный

**161. Основные симптомы ветряной оспы:**

- а) пятнисто-папулезная сыпь
- б) сыпь полиморфная: пятно-папула-везикула-корочка
- в) интоксикация, зуд кожи
- г) увеличение периферических лимфоузлов

**162. Профилактика ветряной оспы:**

- а) карантин 21 день
- б) изоляция больного
- в) вакцинация
- г) взятие слизи из носоглотки на бакпосев

**163. Возбудитель эпидемического паротита:**

- а) бактерия
- б) грибок
- в) микоплазма
- г) вирус

**164. Симптомы эпидемического паротита:**

- а) интоксикация
- б) увеличение слюнных желез
- в) диарея
- г) увеличение лимфатических узлов

**165. Механизм передачи краснухи:**

- а) фекально-оральный
- б) трансплацентарный
- в) трансмиссивный
- г) воздушно-капельный

**166. Сестринский процесс при краснухе:**

- а) бакпосев слизи из носоглотки
- б) изоляция больных, карантин для контактных на 21 день
- в) постельный режим в острый период
- г) соблюдение диеты № 1

**167. Основные симптомы кори:**

- а) пятна Филатова-Коплика
- б) геморрагическая сыпь
- в) пятнисто-папулезная сыпь
- г) ангина

**168. Профилактика кори:**

- а) вакцинация
- б) карантин для контактных 10 дней
- в) изоляция больного на 30 дней
- г) карантин для контактных 21 день

**169. Палочка Борде-Жангу являются возбудителем:**

- а) скарлатины
- б) коклюша
- в) менингококковой инфекции
- г) дифтерии

**170. Сестринский процесс при скарлатине:**

- а) постельный режим, текущая дезинфекция
- б) ограничение питья
- в) введение антитоксической сыворотки
- г) полоскание зева, теплое питье, витаминизированное питание

**171. Характер сыпи при скарлатине:**

- а) везикулезная
- б) геморрагическая, звездчатая
- в) мелкоточечная на гиперемизированном фоне кожи
- г) пятнисто-папулезная

**172. Исход сыпи при скарлатине:**

- а) крупнопластинчатое шелушение
- б) пигментация
- в) бесследно исчезает
- г) отрубевидное шелушение

**173. Основные симптомы менингококкцемии:**

- а) бледность кожных покровов
- б) диарея
- в) геморрагическая сыпь
- г) склерит

**174. Основные симптомы менингококкового менингита:**

- а) ригидность мышц затылка
- б) энантема зева
- в) конъюнктивит
- г) рвота, судороги

**175. Клинические симптомы коклюша:**

- а) кашель сухой, «лающий»
- б) кашель спазматический с репризами
- в) кровоизлияния в склеры
- г) увеличение лимфатических узлов

**176. После изоляции ребёнка с коклюшем из соматического отделения необходимо:**

- а) установить карантин на 21 день
- б) установить карантин на 15 дней
- в) взять кал на баканализ
- г) взять мазок из глотки на бакпосев

**177. Основные симптомы дифтерии зева:**

- а) налеты перламутровые, фибринозные
- б) белый творожистый налет
- в) боли в горле, регионарный лимфаденит
- г) отсутствие болей в горле

**178. Основные симптомы дифтерии гортани:**

- а) отсутствие интоксикации
- б) выражена интоксикация
- в) сухой кашель, афония
- г) отеки, повышение артериального давления (АД)

**179. Профилактика дифтерии предусматривает:**

- а) вакцинацию АКДС и АДС
- б) введение анитоксической сыворотки
- в) антибиотикотерапию
- г) взятие мазка из зева и носа на ВЛ у контактных

**180. Сестринский процесс при коклюше:**

- а) аэротерапия, температура в палате 18-20°C
- б) витаминизированное дробное питание, жидкое и пюрированное
- в) активные, подвижные игры
- г) строгий постельный режим

**181. Условия проведения очистительной клизмы ребёнку 2-х лет:**

- а) объем воды 100 мл, температурой 18°C
- б) объем воды 200 мл, температурой 22°C
- в) лежа на правом боку
- г) лежа на левом боку

**182. Правила введения внутримышечной инъекции детям с гипотрофией:**

- а) кожу в месте инъекции растянуть
- б) кожу в месте инъекции собрать в складку
- в) инъекционное поле обработать 96% спиртом
- г) инъекционное поле обработать 70% спиртом

**183. Кал на яйца глистов берут:**

- а) с поверхности каловых масс
- б) из глубины каловых масс
- в) из прямой кишки
- г) после акта дефекации

**184. Заключительная дезинфекция в случае инфекционного заболевания проводится:**

- а) в очаге после изоляции больного в стационар
- б) после выписки реконвалесцента из стационара
- в) 1 раз в день утром
- г) в конце дня

**185. Жидкие лекарственные средства (настои, отвары) должны храниться:**

- а) в морозильном отделении холодильника
- б) в холодильнике при температуре  $+4+6^{\circ}\text{C}$
- в) при комнатной температуре
- г) при температуре  $0^{\circ}\text{C}$

**186. Правила применения грелки детям:**

- а) температура воды  $60-70^{\circ}\text{C}$
- б) заполнение водой на  $2/3$  объема
- в) температура воды в грелке  $40-50^{\circ}$
- г) заполнение водой на  $1/3$  объема

**187. После введения вакцины вырабатывается иммунитет:**

- а) искусственный
- б) естественный
- в) активный
- г) пассивный

**188. Первый шаг при асфиксии у новорожденных:**

- а) проведение оксигенотерапии
- б) проведение искусственной вентиляции легких (ИВЛ)
- в) санация верхних дыхательных путей
- г) проведение непрямого массажа сердца

**189. Признаки внутричерепной родовой травмы:**

- а) пронзительный крик
- б) судороги
- в) иктеричность кожи
- г) диарея

**190. Уход при тяжелой внутричерепной родовой травме:**

- а) раннее прикладывание к груди
- б) кормление через зонд
- в) наблюдение за дыханием, пульсом, температурой тела
- г) выкладывать на живот

**191. Стафилококковая инфекция является причиной возникновения:**

- а) везикулопустулеза
- б) атопического дерматита
- в) омфалита
- г) физиологической эритемы

**192. Клинические симптомы сахарного диабета у детей первого года жизни:**

- а) сухость кожи, румянец на щеках
- б) фебрильная температура тела
- в) эффект «крахмальной» пленки
- г) анорексия

**193.Правила оценки пробы Манту:**

- а) через 24 часа
- б) через 72 часа
- в) папулу измеряют перпендикулярно оси предплечья
- г) папулу измеряют вдоль оси предплечья

**194.Растворы, применяемые для оральной регидратации:**

- а) гемодез
- б) регидрон
- в) реополиглюкин
- г) оралит

**195.Принципы лечебного питания при острых кишечных инфекциях:**

- а) дробное, дозированное питание
- б) свежие овощи и фрукты
- в) кондитерские изделия, молочнокислые смеси
- г) слизистые супы и каши

**196.Осложнения вирусного гепатита С:**

- а) дисбактериоз
- б) цирроз печени
- в) гломерулонефрит
- г) миокардит

**197.Злокачественное заболевание крови - это:**

- а) железодефицитная анемия
- б) гемофилия
- в) лейкоз
- г) геморрагический васкулит

**198.Объем желудка у новорожденного (в мл):**

- а) 30-50
- б) 100
- в) 120
- г) 150

**199.Туалет носа грудному ребёнку проводят:**

- а) ватными жгутиками
- б) ватными палочками
- в) марлевой турундой
- г) ватными шариками и пинцетом

**200.Проблемы пациента при пневмонии:**

- а) артралгии
- б) затрудненное дыхание
- в) нарушение аппетита
- г) судороги