

**Инструкция: выберите один или несколько правильных ответов.**

**1.Сроки закладки зачатков молочных зубов:**

- а) 5-6 неделя внутриутробного развития
- б) 6-7 неделя внутриутробного развития
- в) конец второй половины беременности
- г) сразу после рождения

**2.Все молочные зубы должны прорезаться к:**

- а) 1,5 годам
- б) 2 годам
- в) 3 годам
- г) 4 годам

**3.Ткани, составляющие зуб:**

- а) эмаль
- б) дентин
- в) пульпа
- г) кутикула

**4.Причина эндемического флюороза:**

- а) недостаток кальция в организме ребенка
- б) инфекционное заболевание ребенка
- в) повышенное содержание фтора в питьевой воде
- г) недостаток фтора в организме матери

**5.Оптимальная нормальная доза фтора в питьевой воде (в мг/л):**

- а) 0,1-0,2
- б) до 0,5
- в) 6-7
- г) 1

**6.Профилактика флюороза включает:**

- а) реминерализирующую терапию
- б) использование герметиков
- в) замену водоисточника
- г) фторсодержащие таблетки

**7.Для осмотра полости рта используют:**

- а) зеркало
- б) зонд
- в) пинцет
- г) экскаватор

**8.Стерилизация инструментов осуществляется способом:**

- а) сухожаровым
- б) автоклавированием
- в) ультразвуковым
- г) замачиванием в дезинфицирующем растворе

**9.Полость рта ограничена:**

- а) полостью носа
- б) губами и щеками
- в) твердым и мягким небом
- г) дном полости рта

**10.Образование зубной бляшки от недостаточной гигиены полости рта:**

- а) ускоряется
- б) замедляется
- в) не изменяется
- г) гигиена не влияет на образование зубной бляшки

**11.К большим слюнным железам относятся:**

- а) околоушные
- б) поднижнечелюстные
- в) подъязычные
- г) язычные

**12.Уровень гигиены полости рта пациента определяется индексом:**

- а) КПУ – интенсивность кариеса постоянных зубов
- б) индексом гигиены
- в) ПМА индекс гингивита
- г) стоматологический эстетический индекс

**13.К стеклоиономерному классу цементов относятся следующие пломбировочные материалы:**

- а) силидонт
- б) Фуджи
- в) фосфат-цемент
- г) Витремер

**14. Назовите пломбировочные материалы для постоянного пломбирования кариозной полости:**

- а) композиты светового отверждения
- б) стеклоиономерный цемент
- в) цинк-оксидэвгеноловая паста
- г) масляный дентин

**15.Материалы для лечебных прокладок:**

- а) цинкфосфатные
- б) кальцийсодержащие
- в) поликарбоксилатные
- г) силикатные

**16.Изолирующие материалы готовятся из цементов:**

- а) цинкфосфатного
- б) стеклоиономерного
- в) силикатного
- г) силикофосфатного

**17. Протравливание эмали проводится для усиления:**

- а) бактерицидных свойств композита
- б) краевого прилегания композитов
- в) антисептического воздействия композита на пульпу
- г) связи «пломба-зуб»

**18. К эндодонтическим инструментам относятся:**

- а) зонд
- б) файлы
- в) гладилка
- г) каналонаполнитель

**19. При пломбировании корневого канала могут применяться штифты:**

- а) гуттаперчевые
- б) термофил
- в) бумажные
- г) анкерные

**20. Антисептики для медикаментозной обработки каналов:**

- а) раствор перекиси водорода 3%
- б) раствор хлоргексидина
- в) физиологический раствор
- г) раствор гипохлорита натрия

**21. ПРО-Файлы относятся к инструментам:**

- а) хирургическим
- б) эндодонтическим
- в) пародонтологическим
- г) для препарирования кариозных полостей

**22. После сошлифования обязательно покрытие тканей зубов:**

- а) коронками
- б) пломбировочным материалом
- в) фторсодержащими препаратами
- г) вкладкой-накладкой

**23. Реминерализующую терапию следует проводить при:**

- а) кариесе дентина
- б) кариесе эмали
- в) кариесе цемента
- г) кариесе корня

**24. Для детей 6 лет в качестве средства гигиены следует рекомендовать:**

- а) зубной порошок
- б) фторидсодержащие зубные пасты
- в) гигиенические зубные пасты
- г) гелевые пасты

**25. Применение фторидсодержащих зубных паст рекомендуется детям с:**

- а) 2 лет
- б) 4 лет
- в) 6 лет
- г) 10 лет

**26. Полоскание полости рта растворами фторидов рекомендуется детям с возраста:**

- а) 3 лет
- б) 6 лет
- в) 12 лет
- г) 16 лет

**27. С помощью зубной щетки и зубной пасты удаляют:**

- а) пелликулу
- б) зубной налет
- в) зубной камень
- г) налет «курильщика»

**28. К дополнительным средствам гигиены относятся:**

- а) эликсиры
- б) ершики
- в) зубные щетки
- г) зубочистки

**29. Герметизация фиссур проводится после прорезывания зубов:**

- а) в течение года
- б) через 2 года
- в) через 5 лет
- г) возраст не зависит

**30. Уровень минерализации эмали зубов с возрастом:**

- а) увеличивается
- б) снижается
- в) остается без изменения
- г) возраст и минерализация не связаны между собой

**31. Система государственных социальных, гигиенических и медицинских мер, направленных на обеспечение высокого уровня здоровья и предупреждения болезней – это:**

- а) диспансеризация
- б) санация полости рта
- в) профилактика
- г) ежегодные осмотры

**32. Наибольшее количество кальция содержат:**

- а) рыба, мясо, птица
- б) желток яйца, печень, хлеб
- в) молоко, сыр, зеленые овощи
- г) молоко, рыба, фрукты

**33. Важные минералы, необходимые для прочности костей и зубов – это:**

- а) железо
- б) фосфор
- в) кальций
- г) натрий

**34. Клинические признаки хронического катарального гингивита:**

- а) кровоточивость дёсен
- б) гиперемия дёсен
- в) наддесневой зубной камень
- г) пародонтальные карманы до 5 мм

**35. Растворы эритрозина, фуксина, Люголя применяют для:**

- а) определения индекса гигиены
- б) определения пародонтологического индекса (СРІТN)
- в) контроля чистки зубов
- г) определения КПУ

**36. Пародонт – это:**

- а) зуб, десна, периодонт
- б) десна, периодонт, кость альвеолы
- в) зуб, десна, периодонт, кость альвеолы, цемент корня зуба
- г) зуб, связки, кость альвеолы

**37. Пародонтит различают:**

- а) локализованный
- б) генерализованный
- в) развившийся
- г) в стадии обострения

**38. Медикаментозная обработка корневого канала растворами протеолитических ферментов проводится с целью:**

- а) воздействия на очаг воспаления в периапикальной области
- б) растворения распада пульпы
- в) антисептической обработки
- в) пломбирования канала

**39. Воспаление надкостницы альвеолярных отростков верхней или нижней челюсти инфекционного или травматического происхождения сопровождающееся сильной болью и опуханием десны - это:**

- а) периостит
- б) периодонтит
- в) кариес
- г) пульпит

**40. Протеолитические ферменты используются при:**

- а) гноетечении
- б) некрозе десны
- в) кровоточивости десны
- г) ретракции десны

**41. Возраст для протезирования у детей:**

- а) 5-6 лет
- б) 12-14 лет
- в) возрастных ограничений нет
- г) 6-12 лет

**42. Для лечения гиперестезии твердых тканей зубов при пародонтозе рекомендуют зубные пасты:**

- а) противовоспалительные
- б) фторсодержащие
- в) гигиенические
- г) кальцийсодержащие

**43. Количество зубов в молочном прикусе:**

- а) 26
- б) 32
- в) 20
- г) 30

**44. Эмалевая призма основным структурным элементом:**

- а) является
- б) не является

**45. Микротвердость эмали при кариесе в стадии пятна:**

- а) снижается
- б) повышается
- в) не изменяется
- г) зависит от распространенности процесса

**46. Проницаемость эмали повышена при:**

- а) кариесе эмали
- б) флюорозе
- в) гипоплазии
- г) пародонтите

**47. Процессы ионного обмена, минерализацию и реминерализацию в эмали обеспечивает:**

- а) микротвердость
- б) проницаемость
- в) растворимость
- г) разрушенность

**48. При кариесе дентина возникает боль от:**

- а) температурных раздражителей
- б) химических раздражителей (кислое, сладкое и т.д.)
- в) постоянная
- г) ночная боль

**49. От раствора глюконата кальция проницаемость эмали:**

- а) повышается
- б) понижается
- в) не изменяется
- г) зависит от дозировки

**50. Наиболее характерный клинический симптом при кариесе разных стадий – боль:**

- а) самопроизвольная
- б) сохраняющаяся, после устранения раздражителя
- в) только в присутствии раздражителя
- г) ночная боль

**51. Бессимптомное течение наиболее характерно для кариеса:**

- а) в стадии пятна
- б) поверхностного кариеса
- в) среднего кариеса
- г) глубокого кариеса

**52. Метод витального окрашивания выявляет очаги деминерализации эмали при:**

- а) эрозии эмали
- б) кариесе эмали
- в) гипоплазии
- г) флюорозе

**53. Реминерализующая терапия, предполагает поступление в очаг деминерализации веществ:**

- а) минеральных
- б) органических
- в) химических
- г) неорганических

**54. Антидоты мышьяка:**

- а) бром
- б) йодиол
- в) метронидазол
- г) унитиол

**55. Пломбировочные материалы, применяемые для пломбирования каналов:**

- а) пасты
- б) гуттаперчивые штифты
- в) лечебные прокладки
- г) бумажные штифты

**56. Пасты, применяемые для пломбирования проходимых корневых каналов зубов:**

- а) цинкоксидэвгеноловая
- б) эндометазоновая
- в) силеры
- г) стеклоиономерный цемент

**57. Для медикаментозной обработки кариозной полости применяются:**

- а) хлоргексидин 0,05%
- б) перекись водорода 3%
- в) спирт 70%
- г) ферменты

**58. Пломбировочные материалы, применяемые для заполнения корневых каналов совместно с гуттаперчей:**

- а) АН-26
- б) Сиалапекс
- в) АН-плюс
- г) эндометазоновая паста

**59. Противовирусные препараты и мази назначают:**

- а) в первые 2-4 дня заболевания
- б) на 5-7 день заболевания
- в) в период ремиссии
- г) на всем протяжении заболевания

**60. К противовирусным средствам относятся:**

- а) раствор интерферона
- б) оксолиновый раствор
- в) масляный раствор витамина А
- г) ацикловир

**61. К эпителизирующим средствам относятся:**

- а) облепиховое масло
- б) бутадионовая мазь
- в) Солкосерил-дентальная адгезивная паста
- г) масляный раствор витамина А

**62. Анестетики, применяемые у пациентов с артериальной гипертензией:**

- а) лидокаин 2% без адреналина
- б) Ультракаин DS forte
- в) Ультракаин DS
- г) Скандонест

**63. К осложнениям во время операции удаления зуба относятся:**

- а) перелом корня
- б) альвеолит
- в) кровотечение
- г) перфорация дна гайморовой пазухи

**64. Для удаления нижних третьих моляров используются щипцы:**

- а) клювовидные, изогнутые по ребру
- б) прямые
- в) специальные щипцы, изогнутые по плоскости
- г) байонетные



**65.Для лечения перелома на нижней челюсти применяется:**

- а) наложение гипса
- б) пращевидная повязка
- в) шинирование
- г) иммобилизация в три сустава

**66.Наконечники стоматологической установки:**

- а) обрабатывают двукратно, дезинфицирующим раствором разрешенным для этой цели
- б) стерилизуют в растворе «Сайдекс»
- в) обрабатывают моющим раствором на основе перекиси водорода
- г) протирают хлоргексидином

**67.Слюноотсосы должны быть:**

- а) чистые
- б) продезинфицированные
- в) стерильные
- г) из упаковки

**68.Карпульные шприцы (в конце рабочей смены):**

- а) только дезинфицируют
- б) только дезинфицируют и стерилизуют
- в) проводят дезинфекцию, предстерилизационную очистку и стерилизацию
- г) не обрабатывают

**69.После стерилизации боры и инструменты для эндодонтии хранят в предварительно стерилизованных боксах в течении (время в часах):**

- а) 6
- б) 12
- в) 24
- г) 48

**70.Генеральная уборка стоматологических кабинетов хирургического профиля проводится:**

- а) раз в 7 дней
- б) раз в 14 дней
- в) раз в месяц
- г) раз в 3 месяца

**71.К комбинированным искусственным коронкам относятся:**

- а) металлокерамические
- б) фарфоровые
- в) металлопластмассовые
- г) штампованные

**72.При отсутствии одного или нескольких зубов показано протезирование:**

- а) несъемным протезом
- б) изготовлением вкладки
- в) съемным протезом
- г) изготовлением шинирующего протеза

**73. После изготовления и наложения съемного протеза проведение коррекции протеза:**

- а) обязательно
- б) не обязательно
- в) по желанию пациента
- г) через 1 месяц

**74. Лечение заболеваний слизистой оболочки полости рта в условиях поликлиники с момента обращения пациента до полного выздоровления возможно в течении:**

- а) 14 дней
- б) 21 день
- в) 1 месяц
- г) 10 дней

**75. К некариозным поражениям зубов, возникших после прорезывания, относятся:**

- а) патологическое истирание
- б) флюороз
- в) клиновидный дефект
- г) гипоплазия
- д) все перечисленное верно